Phänoflex
Österreichweite Flexibilisierung von Schnittzeitpunkten für NAT-Flächen

Vollblüte vom Schwarzen Holunder 2026

Modelliert anhand von 642 Datensätzen, welche über die Webplattform von naturschutzmonitoring.at
von LandwirtInnen und ÖkologInnen dokumentiert wurden.
Die Erklärbarkeit der Daten durch das Multiple Regressionsmodell liegt bei 67,0 %.

Eintritt der Vollblüte

- 14.05.-17.05.
- 18.05.-21.05.
- 22.05.-25.05.
- 26.05.-29.05.
- 30.05.-02.06.
- 03.06.-06.06.
- 07.06.-10.06.
- 11.06.-14.06.
- 15.06.-18.06.
- 19.06.-22.06.

Lagen über 1.500 m werden nicht dargestellt

- Landesgrenzen
- Bezirksgrenzen
- Bezirkshauptstädte
- Beobachtungspunkte
- Gewässer

Datengrundlagen:
Höhenmodell: 90 m - SRTM-Daten; srtm.csi.cgiar.org
Landes- und Bezirksgrenzen: VGD-Stichtagsdaten BEV; www.bev.gv.at
Gewässer: DIVA-GIS; www.diva-gis.org
Orte: OSM; openstreetmap.org
Grundlagendaten Vollblüte Schwarzer Holler: www.mahdzeitpunkt.at
Datenaufbereitung: LACON & grünes handwerk
Modellierung: grünes handwerk

ÖKL
GeoSphere Austria
LACON Landschaftsplanung Consulting
grünes handwerk

Mit Unterstützung von Bund, Ländern und Europäischer Union
Bundesministerium Land- und Forstwirtschaft, Regionen und Wasserwirtschaft
WIR leben Land Gemeinsame Agrarpolitik Österreich
Kofinanziert von der Europäischen Union

N

0 10 20 40 60 80 100 Kilometer